

Instrukcja pielęgnacji zieleni

Po ukończeniu zimowych przymrozków należy wykonać wizję w całym ogrodzie. Usunąć osłony zimowe, rozluźnić warstwę kory pod bylinami, sprawdzić ogólną kondycję roślin, by przystąpić do opisanych niżej zabiegów (usuwanie zeszłorocznych liści, przyschniętych części roślin, cięcie, itp.)

Przez cały okres wegetacyjny należy usuwać wszelkie pojawiające się chwasty i samosiewy na rabatach, wycinać odrosty, przycinać niepożądane pędy.

Należy sprawdzać, czy nie pokazują się braki w ściółce (należy uzupełniać korą ogrodniczą w miarę potrzeby).

Sprawdzać kondycję roślin i trawników na każdym etapie wegetacji. Zwracać uwagę na pojawiające się na liściach przebarwienia i szkodniki. Sprawdzać czy rośliny są odpowiednio „dokarmione”.

NAWOŻENIE. Można zastosować dwa nawożenia w sezonie, tzw. nawożenie wiosenne i jesienne. Pierwsze po ustabilizowaniu się warunków atmosferycznych w okolicach kwietnia, drugie na przełomie sierpnia. Wiosną należy zastosować nawozy wieloskładnikowe typu Azofoska o zbilansowanym składzie poszczególnych elementów pokarmowych $1(N) : 0,5(P_2O_5) : 1,4(K_2O)$ wzbogaconym dodatkowo żelazem, manganem, miedzią, cynkiem, borem i molibdenem. To ważne składniki uzupełniające, zwłaszcza gdy nie można stosować naturalnego nawożenia obornikiem i kompostem. Jesienią należy użyć nawozu, w którym znajdzie się fosfor (P_2O_5) – 13% i potas (K_2O) – 27% a zawartość azotu jest minimalna. Należy stosować dawkę zalecaną przez producenta.

Ze względu na rozłożoną tkaninę p/chwastom nawóz należy rozłożyć wokół rośliny i starać się zmieszać z ziemią i przykryć korą. Pod bylinami i trawami należy ograniczyć dawkę nawozową do niezbędnego minimum (dokładny opis w dalszej części opracowania).

Ze względu na zastosowaną tkaninę, dużą ilość posadzonych traw i bylin, które nie lubią zbyt dużego nawożenia wskazane jest zastąpić, opisane wyżej dwukrotne nawożenie, nawozem typu Osmocote Plus o spowolnionym czasie uwalniania składników odżywczych, który można stosować raz na sezon. Równomiernie zaopatruje rośliny w pokarm bez ryzyka przenawożenia roślin (zwłaszcza bylin i traw), minimalizuje nakład pracy i nie powoduje zanieczyszczenia wód gruntowych. W składzie poza NPK zawarty jest również magnez (Mg) i mikroelementy: Fe (żelazo) - 0,4 % (w tym chelat EDTA) - 0,2%; Mn (mangan) - 0,06 %; Cu (miedź) - 0,05 %; B (bor) - 0,02 %; Mo (molibden) - 0,02 % oraz Zn(cynk) - 0,015%.

Należy zastosować typ o składzie NPK+Mg 15:10:12:2 + mikro o okresie działania 5-6 miesięcy.

Trawniki nawozić za pomocą siewnika, lub ręcznie, przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.

WŁAŚCICIEL FIRMY

Artur Stolarzak



OSKARBUD ARTUR STOLARZAK
UL. KS. AUGUSTYNA KORDECKIEGO 11
05-230 KOBYŁKA
NIP: 113-235-23-57, tel: +48 600 47 57 48
www.oskARBUD.pl, e-mail: artur.stolarzak@gmail.com

OPRYSKI W przypadku zaobserwowania na roślinach obecności larw, mszyc należy opryskać roślinę roztworem Sumi-Alpha 050 EC (na wiosnę) i Confidor 200 SL — 0,04% lub Mospilan 20 SP — 0,02% (w okresie wegetacji), tzw. preparaty układowe wg wytycznych producenta.

Jeśli zostaną zauważone zmiany na liściach o nerkowatym krztałcie, przebarwiające się z jaszielonego do rdzawego koloru jest podejrzenie zarażenia roślin minowcami, błonówkami, itp. Należy przyskać preparatem o działaniu kontaktowym (np. Fastac 10 EC — 0,015%) lub wgłębnym (np. Sumithion Super 1000 EC — 0,075%) wg zaleceń producenta.

W przypadku zauważenia śladów żerowania chrząszczy, larw motyli, itp. również należy stosować preparaty o działaniu kontaktowym lub żołądkowym, typu Owadofos 540 EC — 0,15%.

W przypadku zaobserwowania chorób grzybowych należy zastosować oprysk preparatem typu Topsin M 500, lub innym zamiennikiem grzybobójczym, a opadnięte liście zebrać i usunąć z terenu.

Wszystkie rodzaje oprysków należy wykonywać późnym popołudniem, lub wieczorem, w sprzyjających warunkach pogodowych i powtarzać dwu- lub trzykrotnie w odstępie 7-10 dni.

W późniejszych latach zaleca się stosować na przemian preparaty innych producentów.

CIĘCIA Należy regularnie przeprowadzać cięcia korekcyjne, pielęgnacyjne i sanitarne wg wskazówek znajdujących się w dalszej części opracowania.

Nie ma potrzeby używania maści zabezpieczających na odciętych pędach. Wyjątkiem są jednak duże rany powstałe po niefortunnym odłamaniu się większych gałęzi, lub uszkodzeniu kory.

Jeśli roślina jest silnie uszkodzona i zamiera, należy usunąć ją z rabaty i zastąpić nową, zdrową sadzonką.

PODLEWANIE Należy podlewać rośliny rano i wieczorem w ilości ok. 20-50 litrów/szt. Jednakże rośliny w okresie suszy należy podlewać (ok. 50-150 litrów/szt).

DRZEWA

Sprawdzanie wiązań stabilizujących przez cały okres wegetacji, w szczególności po wystąpieniu silnych wiatrów. Pielenie mis wokół posadzonych drzew. Nawożenie: preferowany nawóz Osmocote Plus – jednorazowa dawka zgodnie z wytycznymi producenta na początku wegetacji na przełomie marca i kwietnia po ustąpieniu mrozów. Cięcia: niewskazane. Ewentualnie, jeśli jest taka konieczność, w przyszłych latach można na przełomie czerwca i lipca wykonać korekcyjne cięcia w koronie, usuwając gałęzie krzyżujące się i rosnące do wewnątrz. Opryski: monitorowanie roślin przez cały okres wegetacyjny.

WŁAŚCICIEL FIRMY

Artur Stolarzak